

在使用前、请务必阅读此说明书。  
并请妥善保存、以便在需要时查阅。

过敏性鼻炎、急性鼻炎

第2類医薬品

鼻づまり、鼻みずに

## CGM 雪の元点鼻スプレー

盐酸纳法唑林的点鼻药

急性鼻炎和过敏性鼻炎会表现出流鼻涕、鼻塞和打喷嚏等不适症状。本产品是喷雾式、所以可以将有效成分雾化地喷入鼻腔、抑制鼻粘膜的炎症、从而改善不适症状。

### 使用上的注意

#### 不可做的事情

以下的人不应使用：曾因本品或本品成分引起过敏症状的人。  
请勿长期连续使用。

#### 商谈

- 以下的人在使用前、请咨询医师、药剂师或注册销售员：
  - 正在接受医师的治疗的人。
  - 怀孕或可能怀孕的人。
  - 曾因药物等引起过敏症状的人。
  - 接受过以下诊断的人：高血压、心脏病、糖尿病、甲状腺功能障碍、青光眼。
- 如果使用后发现以下症状、可能是副作用、所以请立即停止使用、并带着这份说明文档咨询医师、药剂师或注册销售员。

相关部位	症 状
皮肤	皮疹、发红、瘙痒。
鼻	肿胀、刺激感。

极少数情况下、可能会出现以下严重症状。如果出现这些症状、请立刻就医。

症状名称	症 状
休克 (过敏性反应)	使用后立刻出现皮肤瘙痒、荨麻疹、嗓子嘶哑、打喷嚏、喉咙瘙痒、呼吸困难、心悸、意识模糊等症状。

- 如果使用大约3天后症状仍未改善、请停止使用、并带着这份说明文档咨询医师、药剂师或注册销售员。

#### 《效能・效果》

由急性鼻炎、过敏性鼻炎或副鼻窦炎引起的以下症状的缓解：鼻塞、流鼻涕（过多的鼻分泌物）、打喷嚏、头重（感觉头部沉重）。

#### 《用法・用量》

成人（15岁以上）及7岁以上的儿童：每次鼻腔内喷1至2下、每天1至5次。另外、使用的间隔需保持3小时以上。

## ●使用方法




请取下盖子。

握住容器，按下喷嘴2至3次，直到液体喷出。

在平静地吸气时，喷1-2次到鼻腔内。

即使听到液体残留的声音但没有喷出（当液体不出来时）

吸液管的结构如右图所示。由于配有温和的压力弹簧，即使不倾斜容器也可以有效地使用，避免浪费。



●首次使用时，请按几次直到药液呈雾状。

●如果容器横放使用，药液将不会变成雾状，所以请确保容器始终朝上使用。

●使用后，请用干净的纸巾或类似物擦拭瓶口部分，并盖上盖子。

## 《用法·用量的相关注意事项》

- (1) 请严格遵循规定的用法和用量。
- (2) 过度使用可能会导致鼻塞。
- (3) 若让小孩使用，必须在监护人的指导和监督下使用。
- (4) 仅限于点鼻使用，不可口服。

成分	分量(100mL)中	作用
纳法唑林盐酸盐	50mg	这些成分可以收缩鼻粘膜的血管，减轻肿胀和充血，从而改善鼻塞。
氯苯那明马来酸盐	300mg	抗组胺作用可以减少过多的鼻涕分泌。
利多卡因	100mg	局部麻醉作用可以消除疼痛和不适感。

## 《成分·分量》

添加剂：对羟基苯甲酸酯（巴拉宾）、乙醇、pH调节剂、甘油。

## 《保管及处理注意事项》

- ①请在避免直射日光的凉爽处并盖上盖子储存。
- ②请放置在小孩子触及不到的地方。
- ③请不要更换到其他的容器中。（这可能导致误用或影响产品质量。）
- ④请不要与他人共同使用。
- ⑤过期的产品请勿使用。即使在保质期内，开封后为了保持其质量，请尽量尽快使用。

关于本产品的咨询、您可以联系您购买的药店或药房、或以下的“客户咨询处”。

销售商：CGM Innovation 株式会社，地址：110-0003、日本东京都台东区根岸3丁目9番16号

网址：<https://www.cgmgroupp.jp>

客户咨询处：电话：03-6811-2345。

接听时间：9:00-17:00（不包括周六、周日和节假日）。