

使用前、请务必仔细阅读这份说明文档。
并请妥善保存、以便在需要时查阅。

第2類医薬品
镇咳祛痰药

せき、たん、のどに

CGM クラサービッツアトローチ

咳嗽是作为呼吸器官的症状、生理性地出现是很重要的。但是、当笔卖出现时会感到很难受。几乎每个人都有过因喉龙炎症导致的声音嘶哑、喉龙不适、喉龙疼痛等经验。而且、由于痰的原因、在公众面前前弗却寸、咳嗽经常成为一个大麻烦。

本药是淡绿色的、带有芳香的甜糖片、通过在口中逐渐溶解、可以有效地抑制咳嗽、去除痰、并对由喉龙炎症引起的声音嘶哑、喉龙疼痛、喉龙肿胀、喉龙不适等症状具有出色的效果。

△ 使用上的注意

不可做的事情

(如果不遵守、现有的症状可能会恶化、或者容易引发副作用・事故)

1. 下列人群请不要服用：

(1) 曾因本药或本药的成分而产生过敏反应的人。

2. 在使用本药期间，请不要使用以下任何药物

包含其他止咳化痰药、感冒药、镇静剂、抗组胺药的口服药等（如鼻炎口服药、晕车药、抗过敏药等）

商谈

1. 以下人群在使用前请咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人。
- (2) 怀孕或可能怀孕的人。
- (3) 曾因药物等导致过敏反应的人。
- (4) 有以下症状的人：高热。

2. 如果使用后出现以下症状、可能是副作用、应立即停止使用、

并携带这份说明文档咨询医生、药剂师或注册销售人员

相关部位	症状
皮肤	皮疹・发红、瘙痒
消化器	恶心・呕吐、食欲不振
精神神经系	眩晕
呼吸器	呼吸困难、喘息

极少数情况下可能会出现以下严重症状。如果出现这些症状、请立即就医。

症状名称	症状
休克 (过敏性反应/过敏性休克)	使用后立即出现皮肤瘙痒、荨麻疹、声音嘶哑、打喷嚏、喉咙发紧、呼吸困难、心悸、意识模糊等状况。

3. 如果使用5~6次后症状没有改善、请停止使用、并携带这份说明文档咨询医生、药剂师或注册销售人员。

请务必阅读背面。

【效能・效果】

咳嗽、痰

由喉炎引起的声音嘶哑、喉咙疼痛、喉咙肿胀、喉咙刺痛、喉咙不适。

【用法・用量】

请将以下一次剂量放入口中、不要嚼、慢慢地溶解。

年 龄	1回量	1日使用回数	使用间隔
成人(15岁以上)	1錠	6回	2小时以上
11岁以上15岁未滿		4回	4小时以上
8岁以上11岁未滿			
5岁以上8岁未滿		3回	
5岁以下的婴幼儿	请不要使用。		

＜关于用法・用量的注意事项＞

1. 请严格遵守用法・用量。
2. 如果让儿童使用、请在保护者的指导和监督下使用。
3. 本药是含片剂、所以请不要咬碎或直接吞咽。
4. 请不要给5岁以下的婴幼儿使用本药。
5. 取出含片的方法：请像右侧图示那样、用手指尖用力按压含片所在的PTP包装的凸部、撕破背面的铝箔、然后取出。（如果错误地直接吞下可能会刺伤食道粘膜、导致意外伤害。）



【成分和作用】

6片(1片：1.2g)中包含以下成分

成 分	分 量	作 用
七甲基二氢基铵盐水合物	6mg	具有杀菌作用，预防细菌感染。
苯酚酞酸，右旋异丙醇酚	60mg	抑制咳嗽中枢，从而止住咳嗽。
瓜尔醇磺酸钾	140mg	促进气道分泌，稀释痰的粘度，使痰更容易咳出。

作为添加剂、包含精炼白糖、粉末还原麦芽糖水糖果、明胶、聚乙二醇6000、聚维酮、铜氯化钾、硬脂酸钙、香兰素、1-薄荷醇、香料。

【储存及操作注意事项】

1. 请存放在避免直射阳光、低湿度、凉爽的地方。
2. 请储存在儿童触及不到的地方。
3. 请勿将其换放到其他容器中。（这可能会导致误用或品质变化。）
4. 本剂具有吸湿性。打开铝箔袋后，过了一段时间在湿度较高时、可能会发生变色。对于剩余的使用部分、特别注意湿度、如果发现有色变色的部分、请不要使用。
5. 请不要使用过期产品（外盒上有标注使用期限）。

关于本产品的咨询、您可以联系您购买的药店或药房、或以下的“客户咨询处”。
销售商：CGM Innovation 株式会社，地址：110-0003、日本东京都台东区根岸3丁目9番16号
网址：<https://www.cgmgrou.jp>
客户咨询处：电话：03-6811-2345。
接听时间：9:00-17:00（不包括周六、周日和节假日）。