

シンシンラックス錠

解熱鎮痛薬

特徴

シンシンラックス錠は、熱や痛みの司令塔である脳に作用し、発熱や頭痛を効果的に抑えるアセトアミノフェンの製剤です。胃酸から胃壁を守るプロスタグランジンにはほとんど影響しないので、胃にやさしく、眠くなる成分は含まれておりません。

⚠️ [使用上の注意]

- 次の人は服用しないでください。
 - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能・効果]

- 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛（のどの痛み）・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み（ねんざ痛）・月経痛（生理痛）・外傷痛の鎮痛
- 悪寒（発熱によるさむけ）・発熱時の解熱

[用法・用量]

年齢	1回量	服用回数
大人（15歳以上）	1錠	1日3回を限度
7歳以上15歳未満	1/2錠	
7歳未満	服用しないこと	

1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

（用法・用量に関連する注意）

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[用法・用量]

成分	3錠中	作用
アセトアミノフェン	900mg	いたみをやわらげ、発熱症状をしずめます

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- 使用期限（外箱に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは・お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

販売元 **CGM Innovation株式会社** 〒110-0003 東京都台東区根岸3丁目9番16号 <https://www.cgmgroupp.jp>

お客様相談室: TEL.076-435-0878 受付時間/9:00-17:00（土、日、祝日を除く）