

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

サーボン胃腸薬顆粒

胃腸薬

サーボン胃腸薬顆粒の特徴

- 2種類の消化剤により食べ物の消化を助けます。
- ウコンをはじめ5種類の生薬が胃もたれ・胸やけを和らげます。
- 制酸薬(ナトリウムフリー)の働きで胃酸を中和し、胃粘膜を保護します。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)次の診断を受けた人。
腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、下痢
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過走(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、消化促進、胃酸過多、胃部不快感、胃重、げっぷ(おくび)、胃痛。

【用法・用量】

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回 食後に服用してください。
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満の乳幼児	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。