

シンシンラック錠

解热镇痛药

特征

Shinshinlux 片是一种对乙酰氨基酚的制剂、作用于大脑、大脑是发烧和疼痛的指挥塔、有效抑制发烧和头痛。因为几乎不影响保护胃壁的前列腺素不受胃酸的影响、对胃温和、不含有让人昏昏欲睡的成分。

⚠️ 【使用说明】

- 下列人请勿服用。
 - 曾因本药或本药成分引起过敏症状者；
 - 曾服用本药或其他解热镇痛药、感冒药引起哮喘者；
- 如果服用后出现以下症状、可能是不良反应、请立即停止服用、并持此文件咨询医生、药剂师或注册销售者。

关系部位	关系部位
症状	症状
皮肤	皮肤
皮疹发红、发痒	皮疹、发红、发痒
消化器官	消化器官

- 如果服用 5-6 次后症状没有好转、请停止服用、并持此文件咨询医师、牙科医师、药剂师或注册卖家。

【功效/效果】

- 头痛、牙痛、拔牙后疼痛、咽喉痛（喉咙痛）、耳痛、关节痛、神经痛、腰痛、肌肉痛、肩周炎痛、跌打痛、骨折痛、伴随扭伤的疼痛（扭伤痛）、月经痛（痛经）、外伤痛的镇痛
- 恶寒（发热引起的发冷）、发热时的退热

【用法・用量】

年龄	一次量	服用次数
成人（15 岁以上）	一片	1 日 3 回を限度
7 岁以上 15 岁以下	1/2 片	
7 岁以下	不要服用	

每天以 3 次为限、尽量避免空腹服用。服用间隔时间要在 4 小时以上。

<用法用量相关注意事项>

- 请严格遵守规定的用法用量。
- 给小儿服用时、请在监护人的指导监督下服用。

【用法・用量】

成分	三片中	作用
对乙酰氨基酚	900mg	缓解疼痛、缓解发热症状

【保管和处理注意事项】

- 请保管在阳光直射不到的湿气少的凉爽的地方。
- 请保管在小儿够不到的地方。
- 不要用其他容器替换。（会导致误用或质量改变）
- 超过使用期限（外盒记载）的产品不要服用。

▼关于本商品的咨询、请到需要购买的药店、药局、或者下面的“顾客咨询室”。

品牌厂商 **CGM Innovation株式会社** 〒110-0003 東京都台東区根岸 3 丁目 9 番 1 6 号 <https://www.cgmgroup.jp>

客户咨询办公室：TEL.076-435-0878 受理时间 / 9:00-17:00（星期六、星期日、节假日除外）